



ป้องกันลูกน้อยจาก



โรคไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มี **บุงลาย** เป็นพาหะ เมื่อคนถูกบุงกัดจะได้รับเชื้อไวรัสเดงกีอาจจนทพบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที่วงที่จะนำไปสู่การเสียชีวิต

อาการ



ไข้สูง ปวดตามตัว อ่อนแอ ลิ้น ชิม



รับประทานอาหารไม่ได้
อาเจียน ปวดท้อง




อาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ




อาการหนักจน บิดาจะช็อค และเสียชีวิต

การป้องกันโรคไข้เลือดออก



กำจัดภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์บุงลาย



นอนในมุ้ง ทายากันบุง



ควรไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ติดตามอาการ
และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



Content : แผนรณรงค์ประจําปี ๒๕๖๒
การรณรงค์ : โรคไข้เลือดออก
Design : ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
Credit Picture : www.freepik.com



5 ข้อ ป้องกันฝุ่น PM 2.5 พุ้งทั่วเมือง

ใช้

ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น
ทุกครั้ง เช่น หน้ากาก N95

เช็ก

เช็กค่าฝุ่นจากแอปพลิเคชัน
Air4Thai หรือ Life Dee
ก่อนออกจากบ้าน

เลี่ยง

เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
และเผาขยะสุขภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
(เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์
ผู้มีโรคประจำตัว)

ปิด

ปิดประตู หน้าต่าง
ให้มิดชิด
หมั่นทำความสะอาดบ้าน
หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่น

ลด

ลดกิจกรรมก่อฝุ่น
เช่น การจตุรัส การปิ้งย่าง
การเผา การสูบบุหรี่
การใช้รถส่วนตัว
รวมถึงใช้สภาพรถ
เป็นประจำ

